

## **Instrukcja pobrania moczu na badanie ogólne**

Mocz należy pobrać:

- po wypoczynku nocnym
- po toalecie
- z pierwszej porannej porcji
- ze środkowego strumienia
- przy zachowaniu dotychczasowej diety
- stosowanie leków - zgodnie z zaleceniami lekarza
- do czystego jednorazowego pojemnika

Próbkę 50 – 100 ml należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

## **Instrukcja pobrania moczu na badanie ogólne**

Mocz należy pobrać:

- po wypoczynku nocnym
- po toalecie
- z pierwszej porannej porcji
- ze środkowego strumienia
- przy zachowaniu dotychczasowej diety
- stosowanie leków - zgodnie z zaleceniami lekarza
- do czystego jednorazowego pojemnika

Próbkę 50 – 100 ml należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

## **Instrukcja pobrania moczu na badanie ogólne**

Mocz należy pobrać:

- po wypoczynku nocnym
- po toalecie
- z pierwszej porannej porcji
- ze środkowego strumienia
- przy zachowaniu dotychczasowej diety
- stosowanie leków - zgodnie z zaleceniami lekarza
- do czystego jednorazowego pojemnika

Próbkę 50 – 100 ml należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.